

予防接種の種類		接種回数	定期接種の対象年齢	標準的な接種期間	接種方法	綾川町における 予診票配布時期
B型肝炎		初回 2回	生後1歳に至るまで	生後2か月～9か月未満	27日以上の間隔で2回接種	生後2か月頃 「予防接種ノート」
		追加 1回			1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種	
ロタウイルス ※どちらか一方の ワクチンを接種	ロタリックス (1価)	2回	生後6週～24週まで	初回の接種については、 生後2か月～14週6日後までの間	27日以上あけて2回経口接種	
	ロタテック (5価)	3回	生後6週～32週まで		27日以上あけて3回経口接種	
小児用肺炎球菌 (20価)		初回 3回	生後2か月～5歳に至るまで	生後2か月～7か月未満	標準的には、生後24か月までに27日以上の間隔で3回接種	
		追加 1回		生後1歳～1歳3か月未満	標準的には、初回3回接種後60日以上おいて1回接種	
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風 ・ポリオ・ヒブ)		初回 3回	生後2か月～90か月に至るまで	生後2か月～7か月未満	20日以上、標準的には56日までの間隔で3回	
		追加 1回		初回接種終了後、6か月～18か月までの間隔	初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回	
BCG		1回	生後1歳に至るまで	生後5か月～8か月未満	1回接種	
水痘		2回	生後12か月～36か月に至るまで	1回目：生後12か月～15か月 2回目：1回目接種後6か月～12か月の間隔	3か月以上（標準的には6か月）の間隔で2回接種	
麻しん・風しん混合 (MR)		1期 1回	生後1歳～2歳に至るまで		1回接種	
		2期 1回	小学校就学前の1年間（年長児）		1回接種	年長児になる 年度初めに郵送
日本脳炎		第1期 初回 2回	生後6か月～90か月に至るまで	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間	6日以上、標準的には28日までの間隔で2回	生後2か月頃 「予防接種ノート」
		第1期 追加 1回		4歳に達した時から5歳に達するまでの期間	1期初回終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年おいて1回	
		第2期 1回	第2期： 9歳以上13歳未満の者	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	1回接種	9歳になる誕生日前後に 郵送
二種混合(DT) (ジフテリア・破傷風)		1回	11歳以上13歳未満の者	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間	1回接種	11歳になる誕生日前後に 郵送
HPV(9価) (ヒトパピローマウイルス感染症 /子宮頸がん予防)		2回 (開始年齢により3回)	12歳となる日の属する年度の初日から、16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間	15歳未満で開始⇒6か月の間隔をおいて2回 15歳以上で開始⇒2か月の間隔をおいて2回、 1回目の注射から6か月の間隔をおいて1回	小6になる 年度初めに郵送